

# Un 29% de los dirigentes médicos se declara a favor de la eutanasia

La mitad está en contra de que se enseñe el aborto en las facultades de Medicina

EMILIO DE BENITO  
Madrid

Un 29% de los dirigentes de los colegios médicos cree que debería despenalizarse la eutanasia. El apoyo desciende cuando se les plantea que sean ellos los que realicen la intervención. Solo un 21,7% estaría dispuesto a hacerlo. En cambio, el 97,3% de los encuestados está de acuerdo en aplicar tratamientos para eliminar el dolor aunque acorten la vida del paciente, frente a un 1,9% que prefiere no dar calmantes fuertes aunque el paciente no tenga posibilidad de mejoría y esté sufriendo.

Los datos los ha elaborado la consultora PWC con 450 miembros de las juntas directivas de los colegios profesionales que se reunieron en abril. La muestra es reducida, pero se trata de cargos elegidos por los más de 200.000 médicos. Por eso el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, opina que es "lo más representativo que hay".


Otros temas sobre los que se preguntó a los dirigentes son:

» **Aborto.** El 62% considera que debería ser legal el aborto "en el primer trimestre si una mujer o su médico lo deciden". Es decir, avalan la nueva ley, que estipula la intervención libre hasta las 14 semanas. En el extremo opuesto destaca que hay un 8% que cree que no debería permitirse ni aunque exista "una seria amenaza para la vida de la mujer". Un 13% afirma que en casos de violación o incesto la mujer debe ser obligada a seguir con el embarazo. El 70,3% está en desacuerdo con que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno. El rechazo al aborto llega hasta el extremo de que un 51% opina que no se debe ni siquiera enseñar en las facultades de Medicina.


## La opinión de los médicos

### ABORTO


Actitudes sobre la legalidad del aborto en varias situaciones



Opinión de la profesión médica sobre la autonomía absoluta para abortar que concede la nueva ley, a las chicas de 16 y 17 años y a las menores de 16 años con el consentimiento de los padres o tutores




¿Piensa usted que en la formación de los profesionales de la salud debe incluirse la investigación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo?




### PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE

Opinión de la profesión médica sobre el mecanismo de acción fundamental de la PAE




### EUTANASIA Y CUIDADOS PALIATIVOS

¿Debe despenalizarse la eutanasia?



¿Estaría dispuesto a realizar la eutanasia si fuera despenalizada?



Fuente: Organización Médica Colegial.

EL PAÍS

» **Píldora del día siguiente.** A los dirigentes de los colegios médicos no les afecta lo que digan la Organización Mundial de la Salud o las agencias del medica-

mento europea y española. Un 57% opina que la píldora del día siguiente es abortiva, en contra de lo que establecen esos organismos. De hecho, un 7% de ellos

incluso niega que tenga acción anticonceptiva. Un 22,3% de los encuestados considera que nunca debe darse esta medicación a las menores de 16 años.

## Una de cada tres jóvenes ha tenido sexo sin protección

M. R. S., Madrid

El sexo inseguro y el alcohol guardan relación. Algunas borracheras de fin de semana terminan en la cama y sin protección. Así lo refleja un estudio con entrevistas a más de 3.000 mujeres, que revela que una de cada tres jóvenes españolas ha practicado alguna vez sexo sin utilizar ningún método anticonceptivo. El 30% de ellas reconoce que antes había consumido alcohol. Esta circunstancia, dicen en la mayoría de los casos, influyó en que no empleasen anticonceptivos.

Sexo y alcohol es una combinación que se repite casi todos los fines de semana. Para muchos son una combinación inseparable. Seis de cada diez mujeres de entre 18 y 29 años considera que el consumo de estas bebidas elimina las barreras para practicar sexo, según el estudio *Ring 2 Sexo, alcohol y anticoncepción*, realizado por el Círculo de Estudio en Anticoncepción.

"Cuando se bebe mucho, es difícil ser responsable", sostuvo Iñaki Lete, jefe de servicio de Ginecología del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, en la presentación del estudio. Un argumento que compartió la presidenta de la Sociedad Española de Contracepción, Esther de la Viuda, para quien la relación entre el consumo de alcohol y embarazos no deseados, por ejemplo, es muy directa.

### País Vasco

El patrón se repite en casi todas las comunidades, pero en algunas la mezcla tiene más cantidad de alcohol. Es el caso del País Vasco, donde el porcentaje de chicas que ha practicado sexo sin protección después de haber bebido se eleva hasta el 47,3%. También de Baleares (el 40%) y Madrid (36,6%). Las regiones donde menos se da este tipo de situaciones son Navarra y La Rioja. En cuanto al sexo inseguro, independientemente del alcohol, las canarias y las castellanomanchegas son las que más sexo sin protección practican. Las más responsables: asturianas y gallegas.

En la relación entre sexo, alcohol y anticoncepción influyen dos factores, según el estudio: si las jóvenes toman mucho alcohol, se olvida de cosas que tienen que hacer y por otra, si consumen mucho alcohol pueden producirse vómitos y expulsar la píldora anticonceptiva.

Los métodos más utilizados según el estudio: el preservativo (44,5%), seguido por la píldora (28,8%) y el anillo vaginal (7,4%).

# Los neandertales maduraban antes que los humanos modernos

ALICIA RIVERA, Madrid

Los niños neandertales tenían un desarrollo más rápido que los de la humanidad moderna, que tardan más en madurar y en hacerse adultos. Esta característica evolutiva seguramente facilita el aprendizaje adicional y la capacidad cognitiva compleja que hace del ser humano "uno de los organismos más exitosos del planeta", dice Tanya Smith, especialista de la Universidad de Harvard (EE UU). Ese desa-

rollo comparativamente rápido se ha visto en unos análisis de fósiles —especialmente dientes— de once individuos infantiles, realizados con técnicas avanzadas de rayos X (radiación sincrotrón) que permiten ver la estructura interna de las piezas sin dañarlas.

Los científicos explican, por ejemplo, que la edad de un niño neandertal cuyos fósiles se descubrieron en 1830, era de tres años cuando murió y no de cinco, como se había deducido por compa-



Tomografía de una mandíbula neandertal. / ESRF

ración con el patrón de crecimiento de los humanos modernos. Los dientes tienen sutiles marcas de

primates como los chimpancés. Los neandertales estarían en algún punto a mitad de camino.

crecimiento que son algo así como los anillos de los árboles para determinar la edad, comenta Smith. Los científicos han utilizado el sincrotrón europeo ESRF, en Grenoble (Francia), y presentando sus resultados en la revista *Proceedings*.

La estrategia de vivir despacio y morir tarde parece ser una característica clave de nuestra especie, frente a la más primitiva de vivir rápido y morir pronto de